Сероварианты HBsAg и эволюция тестов для его выявления

Мостович Л.А., Безуглова Л.В., Ярославцева О.А.,
Фараносова О.Н., Нетесова И.Г.
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

22 октября 2015 г
Ханты-Мансийск

Основные субтипы HBsAg

- ayw1, ayw2, ayw3, ayw4
- adw2, adw4
- adrq+, adrq-
- ayr

(Courouce-Pauty A.M. et al., 1975; Courouce-Pauty A.M., Plancon A., Soulier J.P., 1983)

Аминокислотные остатки, определяющие специфические детерминанты HBsAg (L. Magnius, H. Norder, 1995)

Позиция	Аминокислотный остаток	Детерминанта
122	Lys	d
	Arg	y
127	Pro	w1/w2
	Thr	w3
	Leu/Ile	w4
160	Lys	w
	Arg	r

Субтипы HBsAg в образцах крови доноров России, определенные с помощью высокоспецифических моноклональных антител

(Нетесова и др., Вопр. Вирусол., 2004)

	ayw2	ayw3	adw2	adrq+	всего
1. Европейская часть России (Архангельск, Белгород, Владимир, Иваново, Калуга, Курск, Липецк, Москва, Орел, Саратов, Тула, Череповец, Ярославль, не опубл.)	103 52,8%	76 39%	15 7,7%	1 0,5%	195 100%
2. Западная Сибирь (Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Тобольск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Горно-Алтайск)	81 57%	58 44%	2 1%	0	141 100%
3. Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток, не опубл.)	37 45%	26 31%	20 24%	0	83 100%
Всего	221 52,7%	160 38,2%	37 8,8%	1 0,2%	419 100%

Субтипы HBsAg и генотипы ВГВ в образцах крови доноров Анадыря (ЧАО), 2007

	ayw2	ayw3	adw2	adrq+
Всего 25	6 (D)	5 (D)	5 (1A, 4C)	9 (C)
%	24	20	20	36

Simposium on HIV Variants and Hepatitis B surface Antigen Mutant

G.G. Schochetman, W.H. Gerlich, M.C. Kuhns

Washington, DC, USA, May 22-24, 2005

- Некоторые тесты не выявляют образцы, содержащие мутации в 143 и 145 а.к. положениях HBsAg.
- Рекомендовано включить выявление мутантов HBsAg в требования, предъявляемые для продуктов, продаваемых в странах Европейского Содружества

Frequency of diagnostically significant hepatitis B surface antigen mutants

Mary C.Kuhns et al., J Med Virol, 2007 (abstract)

- При исследовании 186 HBsAg-положительных хронических носителей у 6 (3,2%) были получены различающиеся в 10 раз результаты в двух разных тестах. Во всех случаях была выделена ДНК ВГВ. В одном случае обнаружена мутация во второй петле, во всех других случаях – мутация в **134 а.к.** положении в первой петле α-детерминанты HBsAg.
- Авторы делают вывод, что по крайней мере **1,1%** HBsAg-положительных носителей могут иметь мутации, влияющие на результат ИФА.

Оценка чувствительности коммерческих тест-систем для иммунодетекции HBsAg по их способности выявлять HBsAg-мутанты вируса гепатита В

Баженов А.И., Коноплева М.А., Фельдшерова А.А., Эльгорт Д.А.,
Хац Ю.С., Лапина Н.Е., Годков М.А., Суслов А.П.
Журн. Микробиол., 2008, №3, с. 48-53

- Из 2510 обследованных HBsAg-положительных сывороток 5 (0,2%) содержали мутантные штаммы HBsAg (3 образца с заменой G145R, 2 образца с заменой S143L)

Встречаемость субгенотипов вируса гепатита В и субтипов HBsAg у коренного населения севера и юго-востока Сибири

Мануйлов В.А., Осипова Л.П., Нетесова И.Г. и др.

Молекулярная генетика, микробиология, вирусология 2010, №4, с. 31 –36

- Из 487 образцов крови бурятов Аларского р-на 40 (8,2%) содержали HBsAg. ДНК ВГВ выделена из 24 образцов, в одном обнаружена мутация «вакцинного бегства» в 145 а.к. положении (в образце также выявлены анти-HBs).
- Общая частота мутации (1 из 40) составляет **2,5%**.

«Оценка влияния массовой вакцинации против гепатита В на генетическое разнообразие вируса гепатита В, заболеваемость и неблагоприятные исходы инфекции», автореферат диссертации канд. мед.наук Клушкиной В.В. , октябрь 2013

- Маркеры ВГВ-инфекции выявлены в 203 из 6217 образцов крови условно здорового населения 6 регионов России в возрасте от детей до года до лиц старше 60 лет
- ДНК ВГВ выявлена в 63 образцах из 203, причем HBsAg был установлен в 61 образце , в 2 образцах – анти-HBc
- в одном изоляте ВГВ из 63 (**1.6%**) обнаружена замена в 145 а.п. (Республика Тыва), причем этот человек был вакцинирован против гепатита В (данные анкеты, заполняемой при сборе образцов крови)

Панель сывороток, содержащих HBsAg разных субтипов и мутантных форм производства ЗАО «Вектор-Бест», D-0540

- 4 серия - 24 лиофилизированные сыворотки крови человека, содержащие HBsAg субтиповой принадлежности:
- **ayw2, adw2, ayw3(varA & B), adrq+**

в концентрациях 0,1; 0,05; < 0,05 МЕ/мл

а также с аминокислотными заменами:

Tyr**134**Phe (ayw2), Ser**143**Leu (ayw3), Gly**145**Arg (adw3), причем последние два образца в концентрациях

0,5; 0,05; < 0,05 МЕ/мл и 0,16; 0,08; < 0,05 МЕ/мл соответственно (аттестация против ОСО-HBsAg, пр-во ГИСК им. Л.А. Тарасевича и НПО «Диагностические системы», Н. Новгород в наборе реагентов **Murex HBsAg Version 3**)

Панель сывороток, содержащих HBsAg разных субтипов производства ЗАО «Вектор-Бест», D-0540

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСР 2012/13718

от 06 августа 2012 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ЗАО "Вектор-Бест",
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК
и подтверждает, что изделие медицинского назначения
Набор образцов сывороток крови, содержащих разные субтипы и мутантные формы HBsAg вируса гепатита В «HBsAg - стандартная панель сывороток» по ТУ 9398-136-23548172-2011 в составе:
24 образца (на основе 8 инактивированных сывороток крови человека, содержащих HBsAg, в трёх концентрациях каждая),
лиофилизированные – по 1 флакону
производства
ЗАО "Вектор-Бест",
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК

класс потенциального риска 3 ОКП 93 9817

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 11452 от 09.04.2012
приказом Росздравнадзора от 06 августа 2012 года № 624-Пр/12

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Е.А. Тельнова

0000197

Эволюция наборов В-Б, Вектоген В HBs-антиген, процедура 1 ч, 44°C, шейкер 500 об/мин (D-0540, 4 серия, 24 образца)

Твердая фаза/конъюгат	ayw2 n=3	adw2 n=3	ayw3 var A n=3	ayw3 var B n=3	adrq+ n=3	T134 Pn=3	S143L n=3	G145 R n=3	всего	%
1МоАт Н/ ПоАт с сер. 978 (сентябрь 2006)	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	0/3	15/24	62,5
2 МоАт Н+G/ ПоАт с сер. 1146 (август 2008)	3/3	2/3	3/3	3/3	2/3	3/3	2/3	2/3	20/24	83
2МоАт Н+Е/ ПоАт с сер. 1341 (июль 2010- настоящее время)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	23/24	96

**ПАНЕЛИ СЫВОРОТОК, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗНЫЕ СУБТИПЫ И МУТАНТНЫЕ ФОРМЫ HBsAg,
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ HBsAg**

Т.В.Кожанова¹, В.В.Клушкина¹, О.В.Исаева¹, О.Е.Попова¹, И.Г.Нетесова², К.К.Кюрегян¹, М.И.Михайлов¹

Клиническая лабораторная диагностика, 2012, №8, 54-57

	ayw2 n=3	adw2 n=3	ayw3 var A n=3	ayw3 var B n=3	adrq+ n=3	T134P n=3	S143L n=3	G145R n=3	всего	%
HBsAg II Elecsys	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	3/3	2/3	2/3	17/24	71
MonoLisa HBsAg Ultra	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	2/3	2/3	21/24	88
ДС ИФА HBsAg – 0,01	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	21/24	88
Вектоген В-HBs- антиген (В-Б, D- 0556)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	2/3	22/24	92

Выявление 24 образцов (0,1; 0,05; <0,05 МЕ/мл) стандартной панели D-0540 4 сер. в наборах с пределом выявления 0,01 МЕ/мл, исследования проводились в ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

	ayw2 n=3	adw2 n=3	ayw3 var A n=3	ayw3 var B n=3	adrq+ n=3	T134 Pn=3	S143L n=3	G145 R n=3	Всего	%
МБС, Д-064 октябрь2010	3/3	0/3	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3	15/24	62,5
МБС, BS- 114-10 (подтв) май2014	3/3	1/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	2/3	20/24	83
Биопалитра, октябрь2014	3/3	0/3	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3	15/24	62,5
ДС В-1254 60 мин 42С май2013	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	0/3	20/24	83
ДС В-1254 сентябрь201 5	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	0/3	20/24	83

Performance evaluation of 70 hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) assays from around the world by a geographically diverse panel with an array of HBV genotypes and HBsAg subtypes.

H. Scheiblaue, M. El-Nageh, S. Diaz, S. Nick, H. Zeichhardt, H.-P. Grunert, A. Prince.
 Vox Sanguinis, (2010) 98, 403-414.

International Consortium for Blood Safety www.icbs-web.org

Table S2: **Analytical sensitivities of the 70 HBsAg test kits evaluated***

HBsAg test kit	Test format	PEI HBsAg ad	ICBS HBsAg Quantitative Panel (sample #, genotype/subtype, country of origin)							
			A/adw2	B/ayw1	B/adw2	C/adr	D/ayw2	D/ayw3	E/ayw4	F/adw4
Detection limits (IU/mL)										
Prism HBsAg; Abbott	ChLIA	0.021	0.017	0.013	0.013	0.014	0.013	0.016	0.013	0.020
Enzygnost HBsAg 5.0	EIA	0.021	0.016	0.045	0.036	0.044	0.016	0.041	0.033	0.041
Advia Centaur	ChLIA	0.023	0.031	0.032	0.024	0.034	0.034	0.040	0.016	0.028
Elecsys HBsAg II Roche	ECLIA	0.023	0.058	0.046	0.046	0.041	0.034	0.049	0.029	0.051
Murex HBsAg Version 3	EIA	0.025	0.033	0.032	0.037	0.031	0.029	0.035	0.022	0.052
DS-IFA-HBsAg Diagnostic Systems (B-1152)	EIA	0.035	0.113	0.079	0.080	0.108	0.067	0.076	0.036	0.110
Architect HBsAg	CLMIA	0.038	0.031	0.031	0.031	0.031	0.025	0.044	0.026	0.031
Ortho HBsAg	EIA	0.040	0.104	0.180	0.143	0.094	0.064	0.094	0.063	0.100
AxSYM HBsAg	MEIA	0.042	0.065	0.033	0.029	0.033	0.037	0.072	0.052	0.041
Hepascan BioService Borovsk	EIA	0.042	0.065	0.050	0.057	0.062	0.056	0.058	0.027	0.044
EIAgen Italia	EIA	0.043	0.041	0.039	0.029	0.060	0.036	0.031	0.018	0.053
ETI-MAK 4	EIA	0.049	0.034	0.037	0.057	0.034	0.034	0.030	0.021	0.047
Monolisa HBsAg Ultra	EIA	0.051	0.057	0.048	0.048	0.055	0.033	0.036	0.017	0.059
Vectohep B - HBs-antigen										
Vector Best D-0555	EIA	0.057	0.083	0.046	0.045	0.064	0.040	0.045	0.017	0.077
Cobas Core HBsAg Roche	EIA	0.082	0.063	0.068	0.067	0.076	0.076	0.072	0.033	0.064
Hepanostika HBsAg Uni-Form II	EIA	0.088	0.075	0.061	0.056	0.082	0.054	0.076	0.032	0.105
Bioelisa HBsAg colour biokit S.A.	EIA	0,119	0,102	0,098	0,108	0,159	0,095	0,158	0,103	0,093

Table S 4: Sensitivity of HBsAg assays in the ICBS HBsAg Clinical Panel and results for the samples which showed difficulties to be detected by some HBsAg test kits*

HBsAg test kit	Clinical Sensitivity (n=146) %	ICBS HBsAg Clinical Panel Samples				
		(sample #, genotype/subtype, HBsAg concentration in IU/mL)				
		#1125 M133L 0.21 IU/mL	#1135 P105R 0.22 IU/mL	#1010 T131I 0.36 IU/mL	#1039 Q101H 72 IU/mL	#1015 S143L >8000 IU/mL
Prism HBsAg Abbott	100	7,81	11,5	77.05	685.71	485.48
Enzygnost HBsAg 5.0	100	7,11	12,34	17.71	48.78	39.66
Advia Centaur HBsAg	100	19.34	13.69	10,02	>1000.00	3,8
Elecsys HBsAg II Roche Diagnostics	100	7,83	5,95	13.16	2553.00	2308.00
Murex HBsAg Version 3 Abbott Murex	100	1,81	2,49	9,11	>max	>max
DS-IFA-HBsAg Diagnostic Systems 1152	100	10.00	3,81	15.85	>max	57.52
Architect HBsAg Abbott GmbH & Co, KG	100	0.21	0.22	0.36	71.99	>250
Ortho Antibody to HBsAg ELISA TS 3	100	1,34	3,6	9,03	>max	16.00
AxSYM HBsAg V2 Abbott	100	3,13	3,25	3,33	125.07	92.23
Hepascan HBsAg BioService Borovsk	100	4,84	1,82	7,02	27.35	25.45
EIAgen HBsAg Kit Adaltis Italia S.p.A.	100	1,04	1,32	5,25	65,64	68,14
ETI-MAK 4 HBsAg EIA Diasorin S.p.A.	100	3,77	5,91	11,52	65.86	>max
Monolisa HBsAg Ultra Bio-Rad	100	1,68	3,15	12,71	44.13	41.66
Vectohep B - HBs-antigen D-0555 Vector Best	100	2,29	1,61	5,12	35.64	34.83
Cobas Core HBsAg Roche	100	1,76	76,08	22,33	76,08	75,71
Hepanostika HBsAg Uni-Form II	100	1,83	1,62	3,49	48,27	50,16
Bioelisa HBsAg colour biokit S.A.	100	1,9	1,78	3,87	18,89	19,06

Число наборов реагентов из 70 с ложно отрицательными результатами при исследовании образцов крови, содержащих мутантные формы HBsAg

HBsAg test kit

ICBS HBsAg Clinical Panel Samples

(sample #, genotype/subtype, HBsAg concentration in IU/mL)

#1125	#1135	#1010	#1039	#1015
M133L	P105R	T131I	Q101H	S143L

0.21 IU/mL	0.22 IU/mL	0.36 IU/mL	72 IU/mL	>8000 IU/mL
------------	------------	------------	----------	-------------

70

45

48

29

3

4

Performance evaluation of 70 hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) assays from around the world by a geographically diverse panel with an array of HBV genotypes and HBsAg subtypes.

- Тесты для выявления HBsAg, включающие несколько моноклональных антител на твердой фазе и поликлональный конъюгат, имеют самые высокие шансы для определения различных эпитопов HBsAg

Выявление 24 образцов (0,1; 0,05; <0,05 МЕ/мл) стандартной панели D-0540 4 сер. в наборах ЗАО «Вектор-Бест», исследования проводились в ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, в августе 2015

	ayw2 n=3	adw2 n=3	ayw3 var A n=3	ayw3 var B n=3	adrq+ n=3	T134 Pn=3	S143L n=3	G145 R n=3	Всего	%
В-Б, D-0543 90 мин 37С 0,01 МЕ/мл	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	24/24	100
В-Б, D-0543 70 мин 42С 0,01 МЕ/мл	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	23/24	96
В-Б, К 3, 60 мин 44С, ш (клон Е) 0,05 МЕ/мл	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	23/24	96
В-Б, К 3, 3 ч 37С, ш (клон Е) 0,01 МЕ/мл	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	23/24	96

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 15 июля 2015 года № РЗН 2015/2887

На медицинское изделие

Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген) по ТУ 9398-461-23548172-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест" (ЗАО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, АБК

Производитель:
Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест" (ЗАО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, АБК

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-5152/36493 от 08.10.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9817

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложения на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 15 июля 2015 года № 4974
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0012763

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 21 августа 2015 года № РЗН 2015/2989

На медицинское изделие

Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
для автоматических ИФА анализаторов (Вектоген В-HBs-антиген-авто)
по ТУ 9398-497-23548172-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест" (ЗАО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, АБК

Производитель:
Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест" (ЗАО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, АБК

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-5148/36499 от 08.10.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9817

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 августа 2015 года № 5916
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0014107

Вектоген В-НВs-антиген-авто

- Комплект 2/Чароит –на автоматическом ИФА-анализаторе «Чароит»

ЧАРОИТ

Автоматический
иммуноферментный
анализатор

ЛАЗУРИТ

Автоматический
иммуноферментный
анализатор

Результаты ПВОК по поиску ошибок (HBsAg, анти-ВГС, анти-ВИЧ) за 2008-2012 годы

маркер	Год участия	Всего участников	Справились по протоколу №1	Справились по всем протоколам
HBsAg	2008-2010	113	87/109 (80%)	50/113 (44%)
	2011-2012	60	44/56 (79%)	23/60 (38%)
HBsAg ХМАО	2008	8	6/7 (86%) 1 лаборатория не прислала протокол №1	6/8 (75%)
анти-ВИЧ-1	2008-2010	31	28 /29(97%)	25/31 (81%)
	2011-2012	33	31 /33(94%)	28/33 (85%)
анти-ВГС	2008-2010	137	91/118 (77%)	76/137 (55%)
	2011-2012	118	93/106 (88%)	66/118 (56%)

В каких протоколах чаще ошибаются?

по результатам 10 цикла ПВОК, **2009-2011** г из **134** лабораторий 5 регионов России.
В 77/134 ЛПУ (57%) были выявлены ошибки при проведении ИФА

№ протокола	Число ошибок	Число протоколов	Ошибок/протокол
№1 контрольный набор невскрытый	61	74	0,8
№4 другой оператор	39	42	0,9
№5 другая процедура анализа	16	29	0,6
№6 дистиллированная вода из аптеки	14	18	0,8
№9 другая отмывка (ручная)	11	16	0,7
№2 вскрытый набор	72	62	1,2
№7 наконечники повторно	17	13	1,3
№10 подтверждающий тест	44	29	1,5
№8 ванночки повторно	21	9	2,3
всего	295	292	1,0

Новый проект: Проведение внутрилабораторного контроля качества (ВЛКК) неколичественных методов ИФА

- Лаборатории-участницы проекта получают контрольные материалы для ВЛКК, наборы реагентов, пакет документов
- В течение 1 месяца исследуют полученные контрольные материалы, заполняют протоколы, отсылают в адрес ЗАО «Вектор-Бест»
- Семинар в регионе с разбором полученных результатов; построением контрольных карт, в том числе р-карт частот выявления маркера, согласно ГОСТ Р 50779.42-99, или других способов оперативного контроля качества; помощью в выборе алгоритма проведения ВЛКК для каждой конкретной лаборатории и др.

Как принять участие в ПВОК по поиску ошибок или (и) в проекте Проведение ВЛКК неколичественных методов ИФА?

- **Обратиться к**
- Нетесовой Ирине Григорьевне
[e-mail: netesova@vector-best.ru](mailto:netesova@vector-best.ru)
тел. (383) 332-24-45; 913-011-21-02

или

- в коммерческую службу ЗАО «Вектор-Бест»
- тел. (383) 332-81-34

Стандарты, содержащие HBsAg в определенной концентрации

- **Международные:**

- Взамен стандарта ВОЗ, производство NIBSC, 00/588, субтип HBsAg adw2, генотип А, 33 МЕ/мл появился новый стандарт 12/226, субтипы HBsAg ayw1/adw2, генотип В4, 47,3 МЕ/мл
- стандарт института Пауля-Эрлиха, HBsAg субтипа Ау, 50000 ед. П-Э/мл; HBsAg субтипа Ад, 100 ед. П-Э/мл; жидкие

- **Национальные:**

- был «ОСО-HBsAg», совместное производство ФГУН ГНИИСиК МБП им. Л.А.Тарасевича, ООО НПО «Диагностические системы», 20 МЕ/мл, субтип HBsAg/генотип ВГВ не указан - **теперь нет!**

Стандарты, содержащие HBsAg в определенной концентрации

- **СОПы предприятий:**
- «ДС-СО-HBsAg», производство ООО НПО «Диагностические системы», 20 МЕ/мл, восстановить в 1 мл (субтип HBsAg/генотип ВГВ не указан)
- «HBsAg-стандартная панель сывороток», производство ЗАО «Вектор-Бест», РУ №ФСР 2012/13718; содержит HBsAg пяти субтипов и трех мутантных форм, в том числе мутация вакцинного бегства
- СОП HBsAg ad, 0,1 МЕ/мл; СОП HBsAg ay, 0,1 ед. П-Э/мл; производство ЗАО «Вектор-Бест», восстановить в 0,2 мл – пока не зарегистрирован

Выводы

- Эволюция наборов реагентов для выявления HBsAg очень тесно связана с новыми данными о мутантных формах этого белка ВГВ
- Стремление изготовителей в России к созданию наборов реагентов с высокой аналитической чувствительностью 0,01 МЕ/мл заслонило другую важную составляющую чувствительности – диагностическую чувствительность по разным серовариантам и мутантным формам HBsAg
- Отсутствие в России национального стандарта, содержащего образцы разных серовариантов и мутантных форм HBsAg, встречающихся в крови населения России, для оценки диагностической чувствительности отрицательно сказывалось и продолжает сказываться на качестве наборов реагентов
- Исчезновение национального стандарта «ОСО-HBsAg» для оценки аналитической чувствительности привело изготовителей к созданию собственных стандартных образцов предприятий (СОП), что не может не отразиться на качестве наборов реагентов для выявления HBsAg

Спасибо за внимание!